2060 Кальциевый комплекс, банка, 180 капс.

2060R Кальциевый комплекс, банка, 90 капс.

2060TR Кальциевый комплекс, банка, 30 капс.

Предназначение	Рекомендации по применению
В качестве источника кальция, витамина $D_3$ , магния, хондроитинсульфата, аскорбиновой кислоты, хрома, кремния, цинка, марганца, бора	Взрослым утром по 2 капсулы 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.
Для повышения резистентности организма к повреждающим стрессовым воздействиям, на этапе реабилитации после перенесенных инфекционных заболеваний	Взрослым утром по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно повторять в течение года.
В период интенсивного расхода кальция: при занятиях спортом, тяжелом физическом труде, вегетарианстве, непереносимости молочных продуктов, при несбалансированной по нутриентам диете	Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — не менее месяца. При необходимости прием можно повторять в течение года.
Для профилактики повышенной утомляемости при напряженной умственной работе	По 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 месяца. При необходимости прием можно повторять.
В комплексных anti-age и beauty программах	Взрослым утром по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно повторять через 3-4 месяца.
Для уменьшения проницаемости сосудистой стенки при воспалительных процессах	По 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 месяца. При необходимости прием можно повторять 2-3 раза в течение года.

В комплексной профилактике	По 1 капсуле 2 раза в день во время
минеральных дефицитов при	еды. Продолжительность приема – 2
длительном употреблении	месяца. При необходимости прием
глюкокортикоидов,	можно повторять 2-3 раза в течение
алюминийсодержащих антацидов,	года.
тиреоидных гормонов, гепарина,	
противосудорожных средств	
В комплексной терапии остеопороза	По 1 капсуле 2 раза в день во время
у взрослых, в том числе	еды. Продолжительность приема – 2
менопаузального, с дефицитом	месяца. При необходимости прием
витамина $D_3$ или выявленным	можно повторять 2-3 раза в течение
высоким риском дефицита	года.
Для профилактики и поддержки	Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день
организма при метаболическом	во время еды. Продолжительность
синдроме, сахарном диабете 2 типа	приема – не менее месяца. При
	необходимости прием можно
	повторять в течение года.